

Když má pejsek problém

NÁŠ ČTYŘNOHÝ KAMARÁD MÁ NĚKDY ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY. NĚKTERÉ Z NICH ZVLÁDNEME SAMI. JAK NA TO, RADÍ PRVNÍ DÍL DOMÁCÍHO LÉKAŘE PRO PSY.

V případě nějakého problému u psa je vždy lepší konzultace se zvěrolékařem a danou situaci řešit individuálně. V dnešní době ale člověk musí platit už ve chvíli, kdy vzal pouze za kliku veterinární kliniky. Proto přinášíme pár rad a zkušeností, které vám mohou s vašim čtyřnohým kamarádem pomoci.

Co dělat, když...

...má pes průjem/zvrací – v první řadě musíte vysadit stravu a psovi dopřát dostatek tekutin, aby nebyl dehydrovaný. Hladovku naordinujte na 24 hodin. Velmi hladovým a naléhavým psům můžete podávat suchou rýži, případně s vařeným bí-

lým masem, jako jsou kuřecí prsa, nebo jen s kuřecím vývarem. Na průjem můžete nasadit například Smectu, která je účinná na více typů průjmu. Když průjem a zvracení přetrvává déle než dva dny a v případě, že objevíte ve stolici krev, neprodle- ně navštivte zvěrolékaře.

...pes kulhá – nejprve ohledáme postiženou nohu, zda nemá zaražený nějaký trn, sklo apod. Zjistíme, jestli nemá tržnou ranku, řez a případně ránu vyčistíme například roztokem Betadine. Noha je na první pohled v pořádku, a přesto se na ni pes nemůže postavit? Je třeba nasadit klidový režim. U mladších psů to může být růstové, je třeba pejska do samotného roku života vůbec

nezatěžovat. Doporučuji psa nosit do schodů, omezit veškeré skákání, časté běhání a měnění směru, to vše může být zátěž pro klouby a může způsobit problém pro správný vývin. Někdy je třeba nasadit podpůrný lék/doplněk stravy, kterých je na trhu plno. Mladé psy bych zbytečně nevystavovala rentgenovému záření, ale dospělé psy je třeba řádně vyšetřit, zda nemají například dysplazii, a poradit se s odborníkem.

...pes snědl nějaký předmět – ano, i to se může stát. Spousta chovatelů a majitelů pejsků už ví, že musejí dávat pozor, jaké hračky psovi dávají. Proto když už se taková věc stane, musí se začít ihned řešit. Když je předmět malý a je šance, že ho pejsek

bez problémů vykálí, je dobré podpořit proces trávení zelím. Předmět se zelím obalí a jde pak lépe ven. Poté je třeba sledovat výkaly, zda se předmět objeví. Dále je možnost vyvolat u psa zvracení a následně podat aktivní uhlí. Toto řešení je možné v případech, že pes předmět ještě nestrávil, tedy do hodiny po sežrání. Někdo doporučuje podat psovi vodu se solí, ale sůl psovi moc neprospěje a navíc to u některých jedinců ani zvracení nevyvolá. Proto je ověřeným „dráždidlem ke zvracení“ 3% peroxid vodíku. Malou dávku (1–4 lžičky) nabrat do injekční stříkačky a vstříknout ji psovi do tlamičky. Výsledek se dostaví okamžitě. Peroxid v žaludku vypění a pes ihned vyzvrací


celý jeho obsah. Zacházet se s ním musí opatrně a určitě je lepší takovéto situaci předcházet. Pejska je třeba hlídat, aby se pěnou nezadusil. Ověřená metoda je morfium, které mu píchne zvěrolékař a efekt je téměř stejný, akorát pro psa náročnější, celý následující den je utlumen – dá se aplikovat též v případech, že předmět nebyl stráven.

V příštím dílu se dozvíte, jak postupovat, když má fena falešnou březost, když pes nechce jíst a má nechutenství a jak psa správně ošetřit, když byl pokousán. Sledujte LETNÍ INSPIRACI.

ANETA KUNCOVÁ
www.chester-sway.cz



Scalibor
Deltamethrin



Je Váš pes v nebezpečí?

 **MSD**
Animal Health

www.scalibor.cz